

กันลื่นเมื่อพื้นเปียก

คุณสมบัติ

ปกป้องคุณ และคนที่คุณรักจากอุบัติเหตุลื่นล้ม เมื่อพื้นเปียกน้ำ ใช้ได้กับพื้นกระเบื้องโดยเฉพาะ ยกเว้นกระเบื้องเคลือบแก้ว ไร้สารตกค้าง เหมาะสำหรับกันพื้นลื่นบนพื้นกระเบื้อง เมื่อเปียกน้ำ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการลื่น เช่น ระเบียง หรือพื้นที่ในห้องน้ำ

- สามารถใช้ได้กับพื้นกระเบื้องทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบแก้ว
- ควรทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะพื้นอาจกลับมาลื่นด้วยคราบสบู่, แชมพู หรือคราบสกปรกอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นด้วย "น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดทั่วไป" แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า เช็ดให้แห้งสนิท

อัตราส่วนผสม

ไม่ต้องผสมน้ำ

การใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นด้วย "น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดทั่วไป" แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้หมด เช็ดให้แห้งสนิท
2. ทดลองทาในพื้นที่เล็กๆ เทน้ำยาจระเข้ กันพื้นลื่น ลงบนฟองน้ำ (เท่านั้น) เพื่อทดสอบผลของน้ำยาที่มีต่อสีของกระเบื้อง(สีอาจจางลง) รวมถึงระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาที่ให้ผลดีที่สุด ควรทิ้งน้ำยาให้ชุ่มตลอด 45 - 60 นาที
3. เมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว(ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสีที่จางลง และระยะเวลาการทำปฏิกิริยา) จึงเทน้ำยาจระเข้ กันพื้นลื่น ลงบนฟองน้ำ แล้วค่อย ๆ ทาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ได้ทดสอบ
4. เมื่อครบเวลาจึงล้างออกด้วยน้ำเปล่า ประสิทธิภาพของน้ำยาก็จะสมบูรณ์
5. หมั่นทดสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากพบว่าประสิทธิภาพกันลื่นลดลง ให้ทำซ้ำอีกครั้ง (รับรองผลเฉลี่ย 1 ปี)"



ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Phosphoric acid 1 - 5 7664-38-2	1 - 5 %
Ammonium bifluoride 1 - 5 1341-49-7	1 - 5 %
Alcohols, C9-11, ethoxylated PH.3	0.1 - 3 %

ข้อควรระวัง

- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือ และแว่นเพื่อป้องกันตลอดเวลา และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
- สีของกระเบื้อง และความมันวาวอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของ น้ำยาอะเร่ กันพื้นลื่น อาจทำให้กระเบื้องที่มีสีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำเงินแก่ สีของกระเบื้องอาจจางลง (ควรทดสอบก่อนว่า ผลที่ได้เป็นที่พอใจหรือไม่) แต่การกันพื้นลื่นยังคงให้ ประสิทธิภาพเหมือนเดิม
- ไม่ควรเท หรือสเปรย์น้ำยา ลงบนกระเบื้องโดยตรง เด็ดขาด จะต้องเทลงบนฟองน้ำ แล้วใช้ฟองน้ำทาลง บนพื้นผิวเท่านั้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และ กรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทกเลนส์ ควรถอดอย่าง ระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศ ถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากาก ในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม คลายกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ในสถานที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ ดูก่อนถึงทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำ จำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และ ควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ชักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตาม ในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการ อยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ปอด ไม่ควร นำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยและถ่ายเท คลายกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ดูก่อนถึงทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มืด ชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่พสน้ำ)
0.5 ลิตร	10 ตร.ม.
3.0 ลิตร	60 ตร.ม.
10.0 ลิตร	200 ตร.ม.
20.0 ลิตร	400 ตร.ม.